



خونریزی رتروبولبار

(خونریزی پشت حدقه چشم)

خونریزی رتروبولبار (خونریزی پشت حدقه چشم) یکی از مهم ترین اورژانس های تهدید کننده بینایی می باشد که در صورت عدم درمان آن ممکن است فرد طی ۹۰ دقیقه بینایی خود را از دست دهد. زمانی اتفاق می افتاد که شریان تغذیه کننده چشم به هر دلیلی از قبیل ضربه یا اعمال جراحی دچار خونریزی شود. بنابراین در صورت تورم و بیرون زدگی چشم به دنبال ضربه یا اعمال جراحی حتما در سریعترین زمان به نزدیک ترین اورژانس چشم مراجعه کنید.

علائم



- ❖ کبودی و تورم پلک ها
- ❖ بیرون زدگی چشم
- ❖ کبودی اطراف چشم
- ❖ کاهش دید
- ❖ درد شدید چشم
- ❖ افزایش فشار چشم
- ❖ جمع شدگی خون اطراف سفیدی چشم

❖ علل :

از علل شایع آن می توان به اعمال جراحی توسط افراد فاقد صلاحیت و ضربه



های غیر نافذ به چشم اشاره کرد.


تشخیص:

توسط متخصص چشم و معاینه پشت اسلیمت معمولاً تشخیص داده می شود.

درمان و مراقبت:

هدف از درمان کاهش فشار از روی عصب بینایی می باشد. که این کار از طریق جراحی و تخلیه خون از حلقه چشم صورت می گیرد. ممکن است در کنار جراحی طبق صلاح دید

پزشک از درمان دارویی نیز استفاده شود.



تهیه کننده :

خانم زهرا سبزواری
سوپروایزر آموزش سلامت
آقای تشکری زاده
رابط آموزش اورژانس

تأیید کننده :

آقای دکتر شکرچیان
فلوشیپ استراییسم
آقای ابوالفضل رحمانی نژاد
مترون بیمارستان

ابلاغ کننده :

آقای دکتر اکبر درخشان
رئیس بیمارستان

