

پیوند قرنیه

قرنیه بخشی از لایه ی شفاف جلوی چشم است که نور از آن عبور می کند.

پیوند قرنیه نوعی عمل جراحی است که طی آن قسمت آسیب دیده ی قرنیه یا کل قرنیه ی بیمار برداشته شده و با یک قرنیه ی جدید و سالم جایگزین می گردد

تاری دید بعد از عمل به تدریج و به آهستگی بهبود میابد.

قرنیه پیوند شده بعد از عمل تا چندین ماه فاقد حس می باشد و ممکن است برخورد اجسام خارجی با آن احساس نشود به همین جهت باید بسیار مراقب چشم جهت جلوگیری از ضربه بود. در این عمل ترمیم بافت دیر جوش میخورد و پس از ترمیم نیز استحکام قرنیه عادی را ندارد، لذا باید به شدت مراقب ضربه و فشار خارجی باشید.

مراقبت های قبل از عمل :

*روز قبل از عمل حمام کنید. مطابق دستور پزشک ناشتا باشید.

مراقبت های بعد از عمل :

*در هفته ی اول پس از عمل حتما از قاب محافظ پلاستیکی استفاده کنید.

*ترمیم بافت پیوندی مدت زیادی طول می کشد و پس از ترمیم نیز استحکام قرنیه عادی را ندارد لذا به جدا مراقب ضربه و فشار خارجی باشید.

*در هفته های اول پس از جراحی از زور زدن ،مالیدن و خاراندن چشم خودداری کنید.

*رژیم غذایی خود را مطابق قبل ادامه دهید.

*به توصیه های جراح در مورد موقعیت سر و نحوه استراحت به دقت عمل کنید زیرا عدم رعایت دستورات موجب شکست درمان میشود.

*نماز خواندن از روز عمل (فقط با تیمم بر سنگ تمیز با نظر پزشک معالج) بلامانع است

*زمان استحمام کردن را از پزشک خود سوال کنید.

*بعد از عمل مسافرت با اتومبیل ، هواپیما و یا هر وسیله نقلیه بلامانع است .

مهم ترین علائم شل و یا پاره شدن بخیه ها عبارتند از:

در صورتی که احساس جسم خارجی در چشم با قرمزی و اشکریزش ،درد و حساسیت به نور همراه بود و یا فقط چشم شما قرمز شد باید سریعاً به اورژانس چشم مراجعه کنید.

پس از چند ماه تا دو سال که قرنیه کامل جوش خورده شود،بخیه ها توسط پزشک برداشته می شود

علائم هشدار دهنده ی پس زدن پیوند که در ۵-۳۰ درصد موارد عمل پیوند اتفاق می افتد و بایستی فوراً درمان گردد عبارتند از:

ناراحتی و درد پایدار در چشم،حساسیت به نور،قرمزی و اشکریزش چشم،ترشح چرکی و کاهش و یا تاری دید.پس در صورت وجود این علائم فوراً به پزشک معالج و یا اورژانس چشم مراجعه کنید.

توجه : مصرف صحیح و به موقع داروها پس از عمل در میزان موفقیت عمل تاثیر زیادی دارد .

در هنگام چکاندن قطره ها در چشم نکات زیر را رعایت نمایید :



مرکز آموزشی، پژوهشی و
درمانی تخصصی چشم
پزشکی



بازنگری (02) ۱۴۰۲/۰۵/۱

بازنگری بعدی

۱۴۰۴/۰۵/۰۱

دفتر بهبود کیفیت و

اعتبار بخشی

کد PH_HE_1400_018

پیوند قرنیه



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش سلامت

گروه هدف: بیماران مبتلا

به پیوند قرنیه

لازم نیست برای چکاندن قطره از خواب بیدار
شوید (با نظر پزشک)

جهت دسترسی آسان به محتوای آموزشی
بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم
الانبیاء(ص) می توانید کد زیر را اسکن نمایید .



منبع: www.uptodate.com

آدرس : مشهد ، چهارراه ابوطالب ، بیمارستان

تخصصی خاتم الانبیاء (ص)

تلفن : ۰۵۱-۳۷۲۸۱۴۰۱-۴

داخلی اورژانس ۱۱۵

داخلی کلینیک سلامت ۱۲۷

آدرس کلینیک سلامت: طبقه همکف اتاق ۸

نمبر : ۰۵۱-۳۷۲۸۵۲۹۲

کدپستی : ۹۱۹۵۹۶۵۹۱۹

چکاندن قطره ها را با رعایت نکات بهداشتی
ترجیحاً توسط فرد دیگری انجام شود.

بعد از چکاندن قطره ، پلک ها را حدود ۳۰-۴۰
ثانیه بسته نگه دارید و آن را مالش ندهید و از
پلک زدن شدید خودداری کنید.

موقع چکاندن قطره مراقب باشید که قطره چکان
با پلک یا چشم تماس پیدا نکند.

درپوش قطره چکان را بلافاصله پس از مصرف
ببندید .

در صورت مشاهده تغییر رنگ یا رسوب قطره از
مصرف آن خودداری گردد .

بین ریختن قطره های مختلف حداقل ۵ دقیقه
صبر کنید تا اثر لازم را داشته باشد.

اگر لازم است قطره و پماد چشمی را باهم مصرف
کنید بهتر است اول قطره در چشم ریخته شود.

مصرف قطره های چشمی براساس دستور پزشک
پس از عمل لازم است. از مصرف و یا قطع

خودسرانه داروها جداً خودداری گردد.

سعی کنید قطره ها را در زمان تعیین شده
استفاده کنید اما در فواصل خواب ۵-۶ ساعت