

داروهای شایع تزریقی داخل چشم شامل

آواستین، استیوانت، تیالیا و آلیا و ... برای کاهش سرعت پیشرفت بیماری و از دست دادن دید در بیماران مبتلا به مشکلات شبکیه ناشی از دیابت، ادم ماکولا و تخریب شبکیه وابسته به سن می باشد که از رشد رگ های خونی غیر طبیعی جلوگیری می کند .

مراقبتهای قبل از تزریق

✓ تزریق به صورت سرپایی انجام میشود و نیاز به بستری و ناشتا بودن ندارد . روز تزریق طبق روال همیشگی صبحانه و ناهار خود را میل کنید .

✓ شب قبل از تزریق، حمام کنید و بهتر است مژه های خود را با شامپوی بچه خیلی آرام بشوئید.

✓ از لوازم آرایشی استفاده نکنید .

✓ مدارک و برگه ها و عکس های مربوط به چشم خود را روز تزریق به همراه داشته باشید .

✓ اگر چشم شما قبل از روز تزریق درد،

قرمزی و ترشح چرکی دارد حتما به پزشک خود اطلاع دهید .

✓ داروهای چشمی قبلی خود را طبق روال معمول استفاده نمایید .

نکات قابل توجه حین تزریق

✓ لازم است روز تزریق جهت تعویض لباس طبق دستورالعمل بخش عمل نمایید .

✓ جهت جلوگیری از آلودگی هنگام تزریق از صحبت کردن ، بالا آوردن دست خود و یا دست زدن به وسایل استریل خودداری کنید و همکاری لازم جهت ریختن قطره بی حسی و بتادین را داشته باشید .

✓ حین تزریق درد ندارید ، فقط ممکن است احساس فشــار نمایید .

مراقبتهای بعد از تزریق

✓ نیازی به پانسمان چشم و قطره جدید نیست و از صبح روز بعد داروهای چشمی قبلی خود را طبق دستور پزشک شروع کنید .

✓ تماس آب و رطوبت با چشم در ۱۲ ساعت اول بعد از تزریق ممنوع است .

✓ شب اول بعد از تزریق به دلیل استفاده از بتادین احتمال ایجاد درد، آبریزش و قرمزی وجود دارد که معمولا برطرف میشود ، همچنین جهت تسکین درد در شب اول میتوانید از مسکن استفاده و در محیط آرام استراحت نمایید . در صورتیکه این علائم تشدید یا بهبود نیافت به اورژانس چشم مراجعه کنید .

✓ وجود نقاط شناور در مرکز دید تا ۲۴ ساعت اول بعد از تزریق طبیعی است و در صورتیکه از روز بعد این نقاط برطرف نگردید به اورژانس چشم مراجعه نمایید .

✓ وجود خونریزی به صورت ناحیه قرمز رنگ در سطح چشم و در محل تزریق بسیار شایع



مرکز آموزشی، پژوهشی و
درمانی تخصصی چشم
خاتم الانبیا(ص)



دفتر بهبود کیفیت و
اعتبار بخشی

بازنگری (۰۲)

۱۴۰۲/۰۹/۱۴


باز نگری بعدی:

۱۴۰۴/۰۹/۰۱

کد

P_PH_HE_1400_017

تزریق داخل چشمی



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش سلامت و بخش جراحی سه
گروه هدف: بیماران تزریق داخل چشمی

جهت دسترسی آسان به محتوای آموزشی
بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم
الانبیاء(ص) می توانید کد زیر را اسکن نمایید .



منبع: www.uptodate.com

آدرس : مشهد ، چهارراه ابوطالب ، بیمارستان

تخصصی خاتم الانبیا(ص)

تلفن : ۴-۰۵۱-۳۷۲۸۱۴۰۱

داخلی اورژانس ۱۱۵

داخلی کلینیک سلامت ۱۲۷

آدرس کلینیک سلامت: طبقه همکف اتاق ۸

نمابر : ۰۵۱-۳۷۲۸۵۲۹۲

کدپستی : ۹۱۹۵۹۶۵۹۱۹

میباشد که بعد از یک تا دو هفته این خونریزی
جذب خواهد شد .

✓ می توانید از روز بعد فعالیتهای روزمره خود
را آغاز کنید .

✓ در صورت نداشتن مشکل چشمی، طبق
برنامه پزشک معالج خود برای ویزیت بعدی
مراجعه نمایید ، زمان ویزیت بعدی معمولاً بین
۴ تا ۶ هفته میباشد .

علائم هشدار

در صورت داشتن این علائم بعد از روز اول
سریعاً به پزشک خود یا اورژانس چشم پزشکی
مراجعه کنید :

➤ درد شدید یا پیش رونده

➤ التهاب و قرمزی و یا ترشح از چشم

➤ تورم پلک ها

➤ تاری دید بیشتر از زمان قبل از تزریق